

PAYS	RECOMMANDATIONS VACCINALES	REMARQUES
<b>AFRIQUE</b>		
Algérie		<b>Pays certifié libre de paludisme en 2019 (OMS) et de fièvre jaune</b>
Angola	- Fièvre jaune (obligatoire pour tous les voyageurs <b>âgés de 9 mois ou plus</b> )	
Botswana	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, <b>ainsi que des voyageurs ayant transité par un pays à risque</b>	
Burundi	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, <b>ainsi que des voyageurs ayant transité par un aéroport d'un pays à risque</b>	
Cameroun	- Fièvre jaune ( <b>obligatoire</b> pour tous les voyageurs âgés de 9 mois ou plus)	
Djibouti		<b>Absence de recommandations pour la fièvre jaune pour les voyageurs venant de pays à risque de transmission (OMS 2019)</b>
Egypte		<b>Poliomyélite</b> : vaccination exigée indépendamment de l'âge et du statut vaccinal. La preuve dans un certificat de vaccination international (cf. annexe 6 du RSI) qu'une dose de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) ou de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) a été administrée au cours des 12 mois précédents et au moins 4 semaines avant le départ est exigée des voyageurs en provenance de pays d'endémie de la poliomyélite (Afghanistan, Nigéria, Pakistan, <b>Papouasie Nouvelle Guinée et Somalie</b> ) et pour faire une demande de visa d'entrée. Preuve d'une vaccination VPO ou VPI pour les voyageurs arrivant de la République démocratique du Congo, du <b>Kenya, du Niger et de la Syrie</b> .
Guinée	- Fièvre jaune exigé des voyageurs <b>âgés de 9 mois ou plus</b> venant de pays à risque de transmission de fièvre jaune	
Guinée Equatoriale	- Fièvre jaune exigé des voyageurs <b>âgés de 9 mois ou plus</b> venant de pays à risque de transmission de fièvre jaune	
Libye	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune	<b>Il n'y a plus d'exigence de fièvre jaune en cas de transit par un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>
Maurice (île)		<b>Le vaccin Fièvre jaune n'est plus exigé des voyageurs venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune (OMS 2019)</b>
Mauritanie	- Fièvre jaune exigé des voyageurs <b>âgés d'un an ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune</b>	
Mayotte (île)		Réduction significative du paludisme dans les îles avec transition vers une phase d'élimination (OMS 2019)
Nigeria	- Fièvre jaune ( <b>obligatoire</b> pour tous les voyageurs âgés de 9 mois ou plus)	
Réunion DOM-ROM		<b>Absence de recommandations pour la fièvre jaune pour les voyageurs venant de pays à risque de transmission</b>

<b>Sao Tome-et-Principe</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant d'un pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, <b>ainsi que des voyageurs ayant transité par un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	
<b>Sénégal</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, <b>ainsi que des voyageurs ayant transité dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	
<b>Swaziland Eswatini</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune <b>ainsi que des voyageurs ayant transité par un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	
<b>Tristan da Cunha</b>		Absence de paludisme et de fièvre jaune. <b>Plus de recommandation concernant la fièvre jaune.</b>
<b>AMERIQUE</b>		
<b>Aruba Antilles néerlandaises</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de de 9 mois ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que des voyageurs ayant transité pendant plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission	<b>Fièvre jaune : l'entrée dans le pays sera refusée en l'absence d'un certificat de vaccination amarile non valide</b>
<b>Argentine</b>		<b>Paludisme : pays certifié libre de paludisme</b>
<b>La Barbade</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune (saut le Guyana et l'île de Trinidad <b>en l'absence de transmission</b> )	
<b>Bolivie</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs <b>âgés d'un an ou plus</b> venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune et qui se rendent dans les régions de l'est des Andes en dessous de 2300 m	
<b>Bonaire</b>	<b>- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de de 9 mois ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que des voyageurs ayant transité pendant plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	
<b>Brésil</b>		<b>Fièvre jaune</b> : la vaccination est recommandée pour les voyageurs âgés de 9 mois ou plus qui se rendent dans les États d'Acre, Amapa, Amazonas, Distrito Federal (y compris la capitale, Brasília), Espirito santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Parana, Piaui, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima et Tocantins, et dans les zones désignées des États suivants : Bahi. La vaccination est également recommandée aux voyageurs se rendant aux chutes d'Iguaçu. Elle n'est pas recommandée pour les voyageurs dont l'itinéraire se limite aux zones qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, y compris les villes de Fortaleza, et Recife.
<b>Colombie</b>		<b>Fièvre jaune</b> : <b>La vaccination est recommandée à tous les voyageurs âgés de 9 mois ou plus qui se rendent en Colombie sauf dans les zones décrites ci-dessous.</b> Elle n'est généralement pas recommandée pour les voyageurs qui se rendent dans les villes de Barranquilla, Cali, Cartagena et Medellin. Elle n'est pas recommandée pour les voyageurs dont l'itinéraire se limite aux zones situées à plus de 2 300 m d'altitude, au département de San Andrés y Providencia et à la capitale Bogota.

<b>Costa Rica</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre <b>(cf remarque)</b>	<b>Fièvre jaune</b> : Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé pour les voyageurs âgés de 9 mois ou plus arrivant de pays présentant un risque de transmission de la fièvre jaune avec l'ajout de la Tanzanie et de la Zambie dans la région africaine ; l'exception de l'Argentine et du Panama dans les Amériques ; et les spécifications suivantes pour ces pays : la Colombie (l'ensemble du pays à l'exception de Barranquilla, Cali, Carthagène, Medellin et San Andrés Providencia y Bogota); L'Équateur (qui ne s'applique qu'à Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbôos y Zamora-Chinchiipe, et exclut le reste du pays) ; Paraguay (l'ensemble du pays à l'exception d'Asuncion, la capitale) ; Pérou (tout le pays à l'exception de Lima, la capitale, Cuzco, el Machu Picchu, la Ruta de los Incas, Lambayeque, Tumbes, Piura et Cajamarca); Trinité-et-Tobago (l'ensemble du pays à l'exception des zones urbaines du port d'Espagne, et pour les voyageurs en transit ou dont les itinéraires sont limités à l'île de Tobago).
<b>Cuba</b>	<b>-Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune ainsi que des voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	
<b>Curaçao</b>	<b>-Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune ainsi que des voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	
<b>Equateur</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus <b>venant du Brésil, de la République démocratique du Congo et de l'OUganda ainsi que des voyageurs ayant transité plus de 12 heures dans un aéroport de ces mêmes pays</b>	<b>Fièvre jaune</b> : la vaccination est recommandée pour tous les voyageurs âgés de 9 mois et plus qui se rendent dans les provinces suivantes à l'est des Andes, à une altitude inférieure à 2300 m : Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos et Zamora-Chinchiipe et dans la province à l'ouest des Andes : Esmeraldas. La vaccination n'est généralement pas recommandée pour les voyageurs dont l'itinéraire se limite aux provinces suivantes à l'ouest des Andes, à une altitude inférieure à 2300 m : Guayas, Los Rios, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsachilas, et dans les zones désignées de Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha et Tungurahua. La vaccination n'est pas recommandée pour les voyageurs dont l'itinéraire se limite aux zones situées à plus de 2300 m d'altitude, aux villes de Guayaquil et Quito et aux îles Galápagos.
<b>Honduras</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune	<b>Il n'y a plus d'exigence de fièvre jaune en cas de transit de plus de 12 heures par un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>
<b>Panama</b>	-Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune ou une transmission active, <b>ainsi que des voyageurs ayant transité pendant plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b> ou avec une transmission active de fièvre jaune	<b>Fièvre jaune</b> : (OMS 2019) la vaccination est recommandée pour tous les voyageurs âgés de 9 mois et plus qui se rendent dans les zones continentales situées à l'est de la zone du canal de Panama (l'ensemble des comarques d'Emberá et de Kuna Yala, la province de Darién et certaines zones des provinces de Colón et Panama situées à l'est du canal). Elle n'est pas recommandée pour les voyageurs dont l'itinéraire se limite aux zones situées à l'ouest du canal de Panama, à la ville de Panama, au canal lui-même et aux îles Balboa et San Blas.
<b>Paraguay</b>	<b>- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d'un an venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune</b>	<b>Paludisme</b> : selon l'OMS le dernier cas autochtone a été rapporté 2011. Les départements endémiques à <i>P. vivax</i> étaient l'Alto Paraná, Canindeyú et Caaguazú.
<b>République dominicaine</b>	<b>- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant du Brésil depuis les états suivants : Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paul et Rio de Janeiro, ainsi que des voyageurs ayant transité pendant plus de 12 heures dans un aéroport de ces mêmes états</b>	

<b>Sint-Marteen Hollande</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs <b>âgés de plus 9 mois ou plus</b> en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.	
<b>Sint-Eustastius Hollande</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs <b>âgés de plus 6 mois ou plus</b> en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune.	
<b>Saint-Vincent-Et-Grenadines Salvador (EI)</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 1 an ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune	<b>Il n'y a plus d'exigence de fièvre jaune en cas de transit de plus de 12 heures par un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>
<b>Suriname</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre jaune, <b>ainsi que des voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	0
<b>Trinité-et-Tobago</b>	-Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, <b>ainsi que des voyageurs ayant restés plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	
<b>Venezuela</b>	-Fièvre jaune exigé des voyageurs <b>âgés d'un an ou plus</b> venant du Brésil, ainsi que pour les voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport au Brésil	
<b>ASIE</b>		
<b>Bangladesh</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d'un an venant de pays à risque de transmission de fièvre jaune <b>ainsi que des voyageurs ayant transité par un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	<b>Paludisme (OMS 2019) : le paludisme existe toute l'année avec un pic entre mai et octobre.</b>
<b>Bhoutan</b>		<b>Fièvre jaune : plus de recommandation selon l'OMS en 2019</b>
<b>Chine</b>		<b>Paludisme</b> : la Chine a réussi à éliminer le paludisme (OMS 2019). Aucun cas de paludisme autochtone n'a été signalé depuis 2017.
<b>Inde</b>		<b>Paludisme</b> (OMS 2019) : Le risque de paludisme dû à P. falciparum et P. vivax existe tout au long de l'année dans l'ensemble du pays en dessous de 2000 m. La majorité du paludisme en Inde provient des régions orientales et centrales du pays et des États qui ont de grandes forêts, des collines et des zones tribales. Ces États comprennent Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra et certains États du nord-est tels que Tripura, Meghalaya et Mizoram. Il n'y a pas de transmission dans certaines parties des États de l'Himachal Pradesh, du Jammu-et-Cachemire et du Sikkim.
<b>Indonésie</b>		<b>Méningite ACYW</b> : la preuve d'une vaccination contre les infections invasives à méningocoque ACYW est requise pour les voyageurs en partance ou arrivant d'Arabie Saoudite.
<b>Maldives (îles)</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs <b>âgés de 9 mois ou plus</b> venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que des voyageurs ayant transité plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission	

<p><b>Nepal</b></p>	<p><b>Paludisme</b> (OMS 2019) : l'infection par le paludisme est présente dans le sud de la région du Terai, principalement dans le Terai intérieur (terre plate) - le long des forêts, des contreforts, des franges forestières et dans les vallées des hautes collines. La transmission du paludisme est principalement saisonnière (mars à octobre) ; les pics se situent pendant la saison des pluies (mai à août). Le risque est principalement dû à P. vivax avec des flambées occasionnelles de P. falciparum de Juillet à Octobre.</p> <p><b>Poliomyélite</b> (OMS 2019) : la vaccination antipoliomyélitique est nécessaire pour les voyageurs en provenance d'Afghanistan, du Kenya, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Somalie.</p>
<p><b>Philippines</b></p> <p>- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, <b>ainsi que des voyageurs ayant transité plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b></p>	<p><b>Paludisme</b> (OMS 2019) : le risque existe toute l'année dans 9 provinces : Palawan, Sultan Kudarat, Davao du Nord, Maguindanao, Sulu, Mindoro occidental, Tawi-tawi, vallée de Cagayan et la ville de Davao</p> <p><b>Poliomyélite</b> (OMS 2019) : un certificat international de vaccination est requis des voyageurs arrivant ou se rendant dans des pays à haut risque.</p> <p><b>Vaccination contre la méningite</b> requise des pèlerins de La Mecque.</p>
<p><b>Sri Lanka</b></p>	<p><b>Poliomyélite</b> (OMS 2019) : il n'y a plus d'exigence de vaccination pour les ressortissant de pays concernée par la poliomyélite.</p>
<p><b>Thaïlande</b></p> <p>- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de pays à risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que des voyageurs <b>restés plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b></p>	
<p><b>Timor Oriental (Timor-Leste)</b></p>	<p><b>Fièvre jaune</b> (OMS 2019) : il n'y a plus de recommandation de vaccination pour les personnes venant de pays à risque de transmission ou ayant transité dans un aéroport d'un pays à risque</p>
<p><b>EUROPE</b></p>	
<p><b>Ukraine</b></p>	<p><b>Poliomyélite</b> (OMS 2019) : Les visiteurs au long cours qui partent vers des États où le poliovirus sauvage ou dérivé d'une souche vaccinale circule devraient présenter une preuve de vaccination avec au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique oral bivalent (bOPV) ou au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans les 12 mois précédents et administré au moins 4 semaines avant l'arrivée. Les personnes obligées d'entreprendre des voyages internationaux urgents doivent être vaccinées avec une dose de vaccin antipoliomyélitique avant leur départ. Les voyageurs recevront un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (ICVP) conformément au Règlement sanitaire international pour enregistrer leur vaccination antipoliomyélitique et servir de preuve de vaccination.</p>
<p><b>PROCHE ET MOYEN ORIENT</b></p>	
<p><b>Afghanistan</b></p>	<p><b>Fièvre jaune</b> (OMS 2019) : plus de recommandation pour les voyageurs venant de pays à risque de transmission</p> <p><b>Poliomyélite</b> (OMS 2019) : preuve d'une vaccination contre la poliomyélite exigée des voyageurs venant de pays endémique. Pour les résidents ou voyageurs séjournant plus de 4 semaines, une preuve de vaccination est requise au départ du pays. La vaccination sera administrée entre 4 semaines et 12 mois avant la date de départ.</p>

## Arabie Saoudite

**Méningite** : Les adultes et les enfants âgés de plus de 2 ans arrivant pour l'Umra, le Hajj ou pour un travail saisonnier dans les zones du Hajj, sont tenus de présenter un certificat de vaccination valide avec un vaccin quadrivalent (ACYW) contre le méningocoque administré au moins 10 jours avant l'arrivée prévue en Arabie saoudite.

La vaccination avec l'un des vaccins suivants est acceptable :

- Vaccin quadrivalent polysaccharide (ACYW) au cours des 3 dernières années.
- Vaccin conjugué quadrivalent (ACYW) au cours des cinq dernières années.

Les preuves scientifiques actuelles suggèrent que les vaccins conjugués sont sûrs et efficaces pour les personnes de plus de 55 ans. Les autorités sanitaires des pays pèlerins devraient s'assurer de vacciner leurs pèlerins dans les délais de validité requis et s'assurer que le type de vaccin est clairement indiqué dans le certificat de vaccination. Si le type de vaccin n'est pas indiqué dans le certificat, il ne sera valide que pendant 3 ans.

La vaccination avec le vaccin conjugué quadrivalent (ACYW) est également requise pour :

- les pèlerins domestiques.
- Résidents des deux villes saintes (La Mecque et Médine).
- Toute personne pouvant entrer en contact avec des pèlerins, y compris le personnel dans les établissements de soins de santé et d'autres autorités.

Le Ministère de la Santé du Royaume d'Arabie saoudite peut choisir d'administrer des antibiotiques prophylactiques à certains voyageurs aux points d'entrée si cela est jugé nécessaire.

**Poliomyélite** : Les voyageurs venant des zones où le poliovirus est transmis activement (transmission active de poliovirus sauvage ou dérivé d'un vaccin) et de pays à risque de réintroduction de la poliomyélite doivent présenter un certificat de vaccination antipoliomyélitique valide. Les voyageurs en provenance d'Afghanistan, de République démocratique du Congo, du Mozambique, du Myanmar, du Niger, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de République arabe syrienne, de Somalie et du Yémen doivent présenter une preuve de vaccination avec au moins l'un des vaccins suivants : (1) Au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique oral bivalent (VPO) au cours des 12 mois précédents et administrée au moins 4 semaines avant l'arrivée ou (2) Au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) au cours des 12 mois précédents et administrée au moins 4 semaines avant l'arrivée.

Voyageurs en provenance d'Afghanistan, du Myanmar, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de République arabe syrienne, La Somalie et le Yémen recevront également une dose de VPO aux points frontaliers à leur entrée en Arabie saoudite.

## Emirats Arabes Unis

- Fièvre jaune exigé des voyageurs de plus de 9 mois venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, **ainsi que pour les voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission**

## Kirghizistan

- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, **ainsi que des voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission**

## Liban

Preuve d'une vaccination contre la **méningite ACYW** requise des voyageurs se rendant au Hadjj, à l'Umra et pour certains pays d'Afrique

<b>Pakistan</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d'un an venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune	<b>Poliomyélite</b> : administration d'un vaccin polio oral (OPV) pour tous les voyageurs en partance pour l'international ainsi que des voyageurs arrivant au Pakistan (> 4 semaines) quel que soit l'âge. Un certificat international de vaccination sera délivré comme preuve de vaccination.
<b>OCEANIE</b>		
<b>Nauru</b>		<b>Fièvre jaune</b> (OMS 2019) : il n'y a plus de recommandation pour les voyageurs venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée</b>	<b>- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d'un an venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que des voyageurs ayant transité par un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	
<b>Pitcairn (îles)</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d'un an venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune	<b>Il n'y a plus d'exigence de fièvre jaune en cas de transit par un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>
<b>Polynésie française (COM)</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d'un an venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, <b>ainsi que des voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d'un pays à risque de transmission</b>	
<b>Salomon (îles)</b>	- Fièvre jaune exigé des voyageurs <b>âgés de 9 mois ou plus</b> venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune	