

Leptospirose

→ Spirolept®

Nature : vaccin bactérien inactivé

La leptospirose est une pathologie bactérienne transmise à l'homme par contact cutané ou muqueux avec des animaux infectés, un environnement humide ou une eau douce souillée par les urines d'animaux excréteurs.

La **vaccination** contre la leptospirose est recommandée dans certaines **indications restreintes**, par le médecin du travail, **au cas par cas**, (évaluation du risque en prenant en compte notamment pour certaines activités professionnelles la possibilité de contact avec des lieux infestés par les rongeurs). L'immunité est acquise en général 15 jours après la 2^{ème} injection

Recommandations / indications vaccinales :

- **En France** : activité professionnelle exposant au risque de contact fréquent avec des lieux infestés par les rongeurs ; telle qu'elle peut se présenter dans les cadres suivants :
 - **curage** et/ou **entretien** de **canaux**, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges,
 - activités liées à la **pisciculture** en eau douce,
 - travail dans les **égouts**, dans certains postes exposés des **stations d'épuration**,
 - certaines activités spécifiques en eau douce pratiquées par les **pêcheurs** professionnels, **plongeurs** professionnels, **gardes-pêche**,
 - certaines **activités** spécifiques aux **COM-ROM** (ex DOM-TOM),
 - secouristes intervenant en zones d'inondation ou de tremblement de terre,
 - également souhaitable pour les **vétérinaires**.
- **Voyageurs** :
 - randonneurs en **zones de rizières**, pratiquants de rafting, plongeurs en eau douce,
 - aux **voyageurs** se rendant régulièrement ou durablement dans des **lieux** éloignés à **haute prévalence** de leptospirose : *Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam), Côte Pacifique de l'Amérique du Sud, Inde, Japon, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Tahiti.*

Schéma vaccinal :

Primovaccination : 2 injections à 15 jours d'intervalle (min. 7 jours, max. 2 mois)
Rappel : 1 injection entre 4 mois à 6 mois puis tous les 2 ans (max. 3 ans).

Contre-indications :

- infection fébrile,
- hypersensibilité connue à l'un des constituants du vaccin ou apparue après une injection du vaccin,
- enfants,
- femme enceinte ou allaitante (par précaution).