

Fièvre Typhoïde

→ Typhim Vi® Typherix®

Nature du vaccin : polyside capsulaire

La typhoïde est une septicémie à point de départ digestif liée à des salmonelles dites majeures : *Salmonella typhi*, *Salmonella Paratyphi* A et B.

Les données mondiales les plus récentes font état de **plus de 20 millions de cas annuels** de fièvre typhoïde, et de plus de **200 000 morts** par an.

C'est une pathologie à **transmission oro-fécale** : la contamination se fait par ingestion **d'eau ou d'aliments contaminés par les selles d'un sujet infecté** malade ou porteur sain chronique (sujet colonisé par les bactéries mais ne déclarant pas les symptômes).

La fièvre typhoïde sévit **dans la plupart des pays du monde** mais, comme toutes les maladies à transmission oro-fécale, ces fièvres surviennent le plus souvent dans des **zones où l'hygiène est précaire**, et frappent principalement les pays en développement en **Asie**, en **Afrique** ou en **Amérique Latine**, la maladie n'ayant pas totalement disparu des pays industrialisés. En Inde, le taux de résistance des salmonelles aux antibiotiques est très élevé, d'où la recommandation systématique de vaccination contre la typhoïde associé à l'hépatite A pour ce pays.

La prévention repose sur la vaccination qui est bien tolérée et ne nécessite qu'une seule injection. L'effet protecteur dure **3 ans** et le taux de protection en zone d'endémie est de 60 %.

IMPORTANT : Ne jamais envisager la vaccination contre la typhoïde seule sans la vaccination contre l'hépatite A. Privilégier le vaccin combiné Hépatite A+Typhoïde (Tyavax®).

Dans tous les cas les **règles d'hygiène alimentaire** et **d'hygiène des mains** doivent toujours être respectées.

Recommandations / indications vaccinales :

- séjours prolongés (plus de 3 semaines),
- quelle que soit la durée du séjour si les conditions d'hygiène sont précaires,
- immigrés qui visitent leur pays d'origine, quelle que soit la durée du séjour.

Schéma vaccinal :

Primovaccination : 1 injection, à faire au plus tard 15 jours avant le départ,
Rappel : 1 injection tous les 3 ans, si nécessaire.

Contre-indications :

- hypersensibilité connue à l'un des constituants du vaccin,
- pas de recommandation avant l'âge de 2 ans, probablement peu efficace avant l'âge de 5 ans.