NOUVEAUTÉS 2021

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2021

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Nouveautés du calendrier 2021 : nouvelles recommandations

- **Vaccin HPV recommandé pour les garçons à partir de 11 ans**

De 11 à 14 ans révolus : schéma 2 doses (**M0-M6**)

Rattrapage possible **de 15 à 19 ans révolus** : schéma 3 doses (**M0, M2, M6**).

Toute vaccination chez le jeune garçon doit être initiée avec le Gardasil9®. La recommandation est applicable depuis le 1er janvier 2021.

- **Priorisation des vaccination anti-Covid**

Poursuite de la campagne en 2021 pour couvrir l'ensemble de la population. Compte tenu de l'approvisionnement progressif en vaccins, une **priorisation des populations à vacciner** a été déterminée par la HAS. Les recommandations et les vaccins disponibles étant amenés à évoluer, un calendrier des vaccinations complémentaire, spécifique à la COVID-19, sera régulièrement actualisé sur le site du ministère de la Santé.

- **Avis HAS du 4.06.21 relatif à la reprise des activités de vaccination**

Diminution importante du nombre de vaccins délivrés pendant la période de confinement, y compris chez les nourrissons : **Vérifier systématiquement le statut vaccinal** de l'ensemble des patients, et saisir toute opportunité d'effectuer, le cas échéant, un rattrapage vaccinal (nourrissons, personnes avec maladies chroniques, immunodéprimées, personnes âgées, femmes enceintes...).

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Couverture vaccinale dans le contexte de la COVID

Évolution de la délivrance des vaccins ROR [Rougeole-Oreillons-Rubéole]

Évolution de la délivrance des vaccins PENTA/HEXAVALENTS pour nourrissons

<https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/covid-19-usage-des-medicaments-de-ville-en-france-3/> consulté le 23 11 2020

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'rateur et présenté sous sa responsabilité.

Couverture vaccinale dans le contexte de la COVID

Évolution de la délivrance des vaccins HPV pour les adolescent(e)s de 11 à 19 ans révolus

Nombre par quinzaine des délivrances sur ordonnance de vaccins anti-HPV durant les 37 premières semaines de 2018, 2019 et 2020 – comparaison observé sur attendu. La période de confinement entre les semaines 12 et 19 est représentée en bleu. Source : rapport EPI-PHARE Usage des médicaments de ville en France durant l'épidémie de Covid-19 – point de situation jusqu'au 13 septembre 2020

<https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/covid-19-usage-des-medicaments-de-ville-en-france-3/> consulté le 23 11 2020

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'rateur et présenté sous sa responsabilité.

La rougeole en France en 2020

Rougeole
Bulletin épidémiologique

18/03/2021

Bilan année 2020

- 90 %

2020 : 240 cas (2019 : 2 636 cas)
= 0,36 cas / 100 000 5,3 cas / 100 000 chez les < 1 an
30,0 % hospitalisés (72) dont 1,3% en réanimation (3)
23 pneumopathies 0 encéphalite
89 % des cas survenus chez des sujets non ou mal vaccinés
34 départements touchés Surtout Bas-Rhin, Haute-Savoie, Ain, Nord, Gironde, Seine-St-Denis

Incidence cumulée et nombre de cas de rougeole déclarés par département* de résidence, France, 1er janvier au 31 décembre 2020

* Attention: pour Paris et les départements de la petite couronne, l'incidence et les nombres de cas par département ne sont lisibles que sur l'agrandissement ci-dessous.

La rougeole en France en 2019

Rougeole
Bulletin épidémiologique

19/02/2020

Bilan année 2019

Cas notifiés à l'ECDC en 2019	
France	2 636 cas
Roumanie	1 706 cas
Italie	1 626 cas
Pologne	1 423 cas
Bulgarie	1 235 cas

2019 : 2 636 cas (2018 : 2 919)
= 3,9 cas / 100 000 42,7 cas / 100 000 chez les < 1 an
28,5 % hospitalisés (752) dont 1,2% en réanimation (31)
184 pneumopathies 2 encéphalites
88 % des cas survenus chez des sujets non ou mal vaccinés
92 départements touchés Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de Loire, PACA et Grand Est.

Incidence par million d'habitants			
Lituanie	296,9	Tchèque	55,6
Bulgarie	175,2	Belgique	43,9
Roumanie	87,3	Luxembourg	41,5
Malte	67,3	France	39,4
Slovaquie	58,6		

Couverture vaccinale pour la vaccination de rappel DTP et coqueluche en France entre 2013 et 2017 : enseignements tirés d'une analyse des données en vie réelle du système national des données de santé

C. Marchal et al. Vaccine 39 (2021) 505-511

CVs contre coqueluche cumulées à l'âge le plus élevé pour chaque visite de vaccination

Histogramme de l'âge des personnes ayant reçue une vaccination de rappel en 2013 et en 2017

* Étude parue en 2020 dans Vaccines, évaluant les couvertures vaccinales (C.V) des rappels dTP, dTcaP et DTcaP, en France, entre 2013 et 2017. Les données de cette étude sont issues de l'Echantillon Généraliste des Bénéficiaires (étude EGB), comprenant plus de 380 000 personnes inscrites au régime générale de l'Assurance Maladie et éligibles à un rappel tétanique entre 2013 et 2017. L'objectif de cet étude est d'estimer la couverture vaccinale cumulée de la vaccination des rappels dans la pratique courante.

- ❑ Les taux de CV des rappels sont insuffisants, bien en deçà de l'objectif de 95 %.
- ❑ Le bon vaccin n'est pas toujours utilisé et les vaccinations sont souvent retardées.
- ❑ Les nouvelles recommandations vaccinales nécessitent plusieurs années pour être mises

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20315887?via%3Dihub>

Vaccins Papillomavirus

Nombre de nouveaux cas de cancers attribuables aux facteurs liés au mode de vie et à l'environnement chez les adultes de 30 ans et plus, France, 2015

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

HPV

> 200 génotypes connus

18 sont potentiellement oncogènes

8 à 12 sont responsables de 95% des cancers HPV induits:

16, 18
et 31, 33, 35, 45, 52, 58

2 (non oncogènes) sont responsables de 90% des verrues génitales:

6, 11

Christine Clavel Cravoisier
CHU Reims
INSERM UMRS 1250

Nicolas Duport. Données épidémiologiques sur le cancer du col de l'utérus Etat des connaissances. Rapport INVS 01/2007

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

HPV et cancer du col : une histoire naturelle particulière Prix Nobel 2008

D'après Etat des lieux du dépistage des cancers du col utérin Sept 2007
www.e-cancer.fr

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Cancer du col de l'utérus

• Tous les cancers du col sont liés aux HPV :

Facteurs de risques associés : tabac, contraceptif oral, exposition *in utero* au diéthylstilbestrol, déficit immunitaire acquis

• Globalement depuis 1990 diminution de l'incidence et de la mortalité du CCU

• MAIS 3 FEMMES MEURENT TOUS LES JOURS

• Incidence des lésions précancéreuses en augmentation chez les 25-44 ans

2 stratégies de prévention : frottis et vaccination

Taux de couverture du dépistage du CCU - 2015-2017

F. Hamers et al. Couverture du dépistage du cancer du col de l'utérus en France 2012-2017, Bull Epidémiol Hebd, 2019

Couverture vaccinale HPV schéma complet 2 doses à 16 ans, France, cohorte naissance 2002

Taux standardisé France métropolitaine: 6,6 [6,3-7,0]
Véthen M et al Estimations régionales et départementales d'incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016. Grand Est. Saint-Maurice : Santé publique France, 2019. 173 p.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Données infra-nationales de couverture vaccinale papillomavirus humains (HPV)

Couverture vaccinale HPV 1 dose à 15 ans par département et par année de naissance (%)

Année de naissance	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Bas-Rhin	30,8	31,5	23,4	22,8	22,1	24,0	24,7	28,5	32,0
Haut-Rhin	28,0	29,4	20,0	18,9	18,2	18,0	20,7	22,9	26,0
Grand Est	35,5	35,6	26,6	26,5	25,4	26,2	29,1	32,6	36,5

Couverture vaccinale HPV schéma complet à 16 ans par département et par année de naissance (%)

Année de naissance	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Bas-Rhin	25,5	23,1	18,4	17,7	15,7	21,9	22,6	25,3
Haut-Rhin	22,6	21,4	15,6	15,1	11,9	17,4	18,5	20,9
Grand Est	30,0	27,1	21,7	20,9	17,5	24,5	26,1	30,3

<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/articles/donnees-infra-nationales-de-couverture-vaccinale-papillomavirus-humains-hpv>

11 juillet 2019

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Composition des vaccins et part de prévention des cancers selon le génotype

9 génotypes sont responsables de la majorité des lésions HPV induites

Vaccination HPV : un recul impor

Près de 130 pays et territoires ont introduit la vaccination HPV dans leurs programmes nationaux de vaccination depuis 2006 (1)

En Juin 2020 : plus de 370 millions de doses de vaccins HPV distribuées (2)

Preuves d'efficacité en vie réelle sur³:

- **La prévalence de l'infection**
- **Les lésions précancéreuses**
- **Le cancer du col de l'utérus⁴**

References

- 1-PATH. Global HPV vaccine introduction overview. May 2020*
2. Données internes MSD
3. Drolet M & al. The Lancet 2019 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30298-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30298-3)
4. Lei et al. NEJM. 2020

Document communiqué sous le usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

Inde

20 000 filles non mariées 10-18 ans
Suivi 7 ans qHPV

References

1. Sankaranarayanan, R., et al. 2016. Immunogenicity and HPV infection after one, two, and three doses of quadrivalent HPV vaccine in girls in India: a multicentre prospective cohort study. *Lancet Oncol*, 17, 67-77. [10.1016/S1470-2045\(15\)00414-3](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)00414-3)

Adapted from [2]. * For the three-dose (Day 1, 60, 180 or 0, 60, 180) and two-dose (Day 1, 180) or 0, 180) groups, one month after last dose MFI values are used, while for single-dose group, month 12 MFI values are used.

Immunogénicité

Persistance des titres d'anticorps au long cours quel que soit le nombre de doses reçues (1, 2 ou 3)

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

Australie : quasi disparition des infections à HPV 6/11/16/18 chez les femmes de 18 à 24 ans

Infection

Contexte : - Vaccination HPV introduite en 2007
- CV élevée chez les plus jeunes (>80%)

Méthodologie : - Impact en population, JF 18-24 ans
- Prévalence HPV 6/11/16/18 avant (2005-2007) vs après (2010-2012 et 2015) introduction du programme vaccinal

9 ans après l'introduction d'un programme de vaccination HPV, les infections HPV couvertes par la vaccination ont presque disparu chez les australiennes de 18-24 ans

Machalek DA et al. J Infect Dis 2018;217(10):1590-1600

Prévalence des infections HPV aux USA : après 10 ans de suivi en vie réelle, réduction très importante de la circulation des types couverts par la vaccination

Contexte : - Vaccination HPV introduite en 2007

Méthodologie : - Impact en population, JF 13-26 ans
- Prévalence HPV 6/11/16/18 avant (2006-2007) vs après (2016-2017) introduction du programme vaccinal

Spinner et al. Pediatrics 2019

Australie : impact sur les verrues génitales 2004-2011

Verrues génitales

Verrues génitales : Femmes

Ali H et al. BMJ 2013;346:f2032

Verrues génitales : Hommes hétérosexuels

Etude observationnelle avant / après

Proportion de femmes nées en Australie, avec un diagnostic de verrue génitales à la première visite, par groupe d'âge, entre 2004 et 2011

Proportion d'hommes hétérosexuels nés en Australie, avec un diagnostic de verrue génitales à la première visite, par groupe d'âge, entre 2004 et 2011

Lésions précancéreuses

Incidence trimestrielle des anomalies histologiques de haut grade (HGA) : CIN2, CIN3, AIS (nombre de nouveaux diagnostics /100 femmes dépistées) :

Courbe lissée :

n = 13620 femmes < 18 ans dépistées en phase prévacinale ; n = 5538 femmes < 18 ans dépistées en phase postvacinale

1. Brotherton JML & al. Lancet 2011; 377: 2085-92

Lésions précancéreuses

Prévalence HPV 16/18 passe de **30 %** (cohorte pré-vaccination) à **4,5 %** (cohorte vaccinée) → **efficacité** vaccin bivalent de **90 %**

Etude Cochrane

Cochrane Database of Systematic Reviews

www.cochranelibrary.com

26 essais contrôlés randomisés inclus, > 73 000 femmes

Réduction du risque de lésions pré-cancéreuses du col de l'utérus* liées aux types vaccinaux :
164 pour 10 000 vs 2 pour 10 000

9 mai 2018

Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors (Review)

⇒ **La vaccination HPV est sûre**
Risque d'EI sévères similaire entre groupes vaccinés et contrôles

Arbyn M, Xu L, Simoons C, Martin-Hirsch PPL. Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD009069. DOI: 10.1002/14651858.CD009069.pub3.

*CIN2+

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Finlande : 1^{ères} preuves de l'efficacité des vaccins HPV en prévention des cancers

Cancer CU

Luostarinen T et al. Vaccination protects against invasive HPV-associated cancers. Int J Cancer. 26 Dec 2017

Vaccination protects against invasive HPV-associated cancers
Teijo Luostarinen¹, Dan Apter², Jaakko Dillner³, Taina Eriksson⁴, Katja Harjula⁵, Karl Natunen⁶, Jarmo Paavonen⁷, Eero Pukkala⁸ and Matti Leinonen⁹*

NOMBRE DE FILLES INCLUES ENTRE 14 et 19 ANS	GRUPE VACCINE HPV	GRUPE NON VACCINE HPV
	9 529 jeunes filles	17 838 jeunes filles
NOMBRE DE CANCER HPV	0	10
Efficacité clinique des vaccins HPV en prévention de cancers liés à HPV	100 % [95 % CI:16-100]	

Pas de différence d'incidence entre groupes vaccinés et non-vaccinés pour les cancers « non HPV-induits »

Australie : premier pays à éliminer le cancer du col de l'utérus¹

□ Couverture vaccinale HPV importante (> 80 % jeunes filles)²

1- Pr Susanne Garland. Media statement March 3rd 2018
2- Machalek et al. JID 2018
3- Hall et al. Plos One. 14 Feb 2018
4- Brisson et al. Lancet Public Health 2016 1e8-e17

□ Large stratégie vaccinale « multi-cohorte » chez les femmes rattrapage jusqu'à 26 ans, avec CV élevée²

□ Introduction de la **vaccination des garçons**, + haute CV²⁻⁴

□ Introduction du **vaccin nonavalent** (Janvier 2018)²

□ Implémentation d'un dépistage primaire par test HPV, au sein d'un dépistage national organisé

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Australie : Une modélisation mathématique prévoit l'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 20 ans

Cancer CU

Si un **haut niveau de vaccination et de dépistage** est maintenu, le **cancer du col de l'utérus** pourrait **disparaître** en Australie, en tant que problème de santé publique, **d'ici 20 ans**.

* Le taux d'incidence annuelle standardisée pour l'âge de 6 cas / 100 000 femmes (définition des cancers *rare*s en Australie et en Europe) a été considéré comme correspondant à une élimination potentielle du cancer du col de l'utérus

Hall MT & al. Lancet Public Health 2018 : S2468-2667(18)30183-X.

23

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

Suède : étude en « vie réelle » confirme l'efficacité de la vaccination HPV en prévention des cancers

Méthode :

Etude d'efficacité « *effectiveness* », sur la base des **registres suédois**
Comparaison de l'**incidence des cancers du col invasifs (CCI)** entre des jeunes filles/femmes **vaccinées et non-vaccinées pour le HPV**

Etude réalisée sur l'ensemble de la population des jeunes filles/jeunes femmes suédoises, âgées entre 10 et 30 ans, entre 2006 et 2017

Résultats : Sur la base de **> 1,6 M de jeunes filles/femmes**

Réduction significative du risque de CCI après vaccination

- **88%** [95% CI : 66-100%] lorsque la vaccination était initiée **avant l'âge de 17 ans**

- **53%** [95% CI: 25-73%] lorsque la vaccination était initiée **entre 17 et 30 ans**

Cancer CU

Figure 2. Cumulative Incidence of Invasive Cervical Cancer According to HPV Vaccination Status.

Age at follow-up is truncated in the graph because no cases of cervical cancer were observed in girls younger than 18 years of age.

La vaccination HPV était associée à un risque significativement plus bas de CCI. La réduction observée était d'autant plus importante que la vaccination HPV était initiée jeune.

Lei, J., et al. (2020). "HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer." *New England Journal of Medicine* 383(14): 1340-1348.

Document scientifique réservé à

Etats-Unis : prévention des cancers des VADS HPV-induits : une extension d'indication maintenant effective

Cancer ORL

La FDA à approuvé une nouvelle indication pour la vaccination HPV sur son territoire :

Elle concerne la « prévention des cancers de l'oropharynx et des autres cancers des voies aéro-digestives supérieures*»

Rationnel ?

Spécificités de l'épidémiologie locale, cancers des VADS

Fraction attribuable au HPV élevée : oropharynx ~70%

Augmentation importante récente

Fardeau considérable
1^{ère} cause de cancers HPV-induits aux US (avant le cancer du col)

1-Van Dyne EA & al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018;67:918-924
2- Chaturvedi AK & al. J Clin Oncol 2018;36(3):262-267

* dus aux types HPV couverts par cette vaccination

Données en faveur du bénéfice de la vaccination HPV

Prévalence des infections orales – types couverts par la vaccination - parmi des américains de 18 à 33 ans entre 2011 et 2014 (d'après [2])

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Bénéfice de la vaccination HPV en prévention des récurrences de CIN2+ après conisation

Post Conisation

La vaccination HPV constituerait un complément bénéfique au traitement chirurgical des lésions précancéreuses du col

En France, la vaccination HPV n'est pas recommandée en prévention des lésions récurrentes

Ghelardi A. & al. Gynecol Oncol. 2018. pii: S0090-8258(18)31163-6.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Vaccins HPV et tolérance : de multiples preuves d'efficacité et de sécurité après plus de 12 ans d'expérience en vie réelle

Contents lists available at ScienceDirect
Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology
journal homepage: www.elsevier.com/locate/bpobgyn

Vie réelle

MAJOR ARTICLE

Very Low Prevalence of Vaccine Human Papillomavirus Types Among 18- to 35-Year Old Australian Women 9 Years Following Implementation of Vaccination

Dorothy A. Machalek,^{1,2} Suzanne M. Garland,^{1,2} Julia M. L. Brotherton,^{1,3} Deborah Bateson,^{4,5} Kathleen McNamee,^{6,7} Mary Stewart,⁸ S. Rachel Skinner,⁹ Bette Liu,¹⁰ Alyssa M. Cornall,¹¹ John M. Kaldor,¹² and Sepelir N. Tabrizi¹³

Population-based HPV vaccination programmes are safe and effective: 2017 update and the impetus for achieving better global coverage

Julia M.L. Brotherton^{a, b, *}, Paul N. Bloem^c

ORIGINAL ARTICLE

HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer

Jiayao Lei, Ph.D., Alexander Ploner, Ph.D., K. Miriam Elfström, Ph.D.,

Vaccination protects against invasive HPV-associated cancers

Tapio Luostarinen^{1,2}, Dan Apter³, Joakim Dillner², Tiina Eriksson⁴, Katja Harjula⁴, Kari Natunen⁴, Jorma Paavonen⁵, Eero Pukkala^{1,4} and Matti Lehtinen^{2,4}

Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis

Mélanie Drolet, Élodie Bénéard, Norma Pérez, Marc Brisson, on behalf of the HPV Vaccination Impact Study Group

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présent

De nombreuses études rassurantes

09/2015 Assurance Maladie
2015 MAI : GB ?

2017 Evènements indésirables graves

2018 Maladies auto-immunes et neurodégénératives

2019 POTS et CRPS

270.000.000 de doses
1,7 cas d'anaphylaxie/1.000.000
Syncope

2019: <https://sfsep.org/sep-et-vaccinations/>

Le point sur l'innocuité des vaccins contre le HPV

Les vaccins ne sont pas associés à un risque accru de survenue d'une SEP ou d'un premier épisode démyélinisant du système nerveux central, y compris les vaccins contre l'hépatite B et le papillomavirus humain

Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors (review)

Arbyn M, Xu L, Simoons C, Martin-Hirsch PPL
Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 9;5:CD009069. doi: 10.1002/14651858.CD009069.pub3. Review.

Cluster analysis of serious adverse event reports after human papillomavirus (HPV) vaccination in Danish girls and young women, September 2009 to August 2017

Ward Daniel, Thorsen Nicklas Myrthue, Frisch Morten, Valentiner-Branth Palle, Molbak Kåre, Hviid Anders. A cluster analysis of serious adverse event reports after human papillomavirus (HPV) vaccination in Danish girls and young women, September 2009 to August 2017. Euro Surveill. 2019;24(19): pii=18003500. <https://doi.org/10.2807/1522-2675.18003500>

Contents lists available at ScienceDirect
Vaccine
journal homepage: www.elsevier.com/locate/vaccine

No increased risk of Guillain-Barré syndrome after human papillomavirus vaccine: A self-controlled case-series

Nick Andrews^{a,*}, Julia Stowe^b, Elizabeth Miller^c

2019 Guillain Barré

Vaccination universelle Papillomavirus

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Il n'y a pas que le cancer du col ! Il n'y a pas que les filles !

Estimation du nombre de nouveaux cas de cancers liés à HPV en France ~ **6300**
Prévention hautement probable par HPV 9 ~ 5000

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

HPV : pas de dépistage en dehors du col de l'utérus

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité

Aperçu des progressions des couvertures vaccinales en Europe

- Contrairement à ce qui pourrait être attendu, on voit que l'année d'initiation du programme de vaccination ne préjuge pas systématiquement d'une meilleure CV...
- Ce constat met en évidence les **stratégies vaccinales et les process plus ou moins efficaces** selon les pays.
- **Les pays initiateurs après 2011** semblent s'être appropriés les **Facteurs clefs de succès...**

Fig. 4. Timeline of Human Papillomavirus vaccination policies and vaccination coverage rates in European countries, 2010-2017.

Au dessous de 30% de CV, 4 pays restent en queue de Peloton : la Grèce (28% en 2011), la France (21% en 2016) puis La Pologne (8% en 2013) et la Bulgarie (3% en 2015). Ces pays ne semblent pas s'être appropriés les facteurs clés de succès de leurs voisins...

Classement des CVs HPV en Région Europe (OMS) en 2019 (%)

Académies, ligues et institutions

Collèges professionnels

Sociétés Médicales

Associations, Sociétés spécialisées, Groupe Scientifiques

Syndicats médicaux

Associations de patients et de dépistage

L'appel des 50 en mars 2019

Infections et cancers dus aux papillomavirus (HPV) en France
« Appel des 50 » : Académies, Collèges, Sociétés et Syndicats médicaux¹
pour un dépistage et une vaccination universelle contre le papillomavirus
soutenu par des personnalités médicales et 6 associations de parents et de dépistage

Communiqué de presse
Le 20 mars 2019

Le papillomavirus est responsable de nombreux cancers et d'autres maladies touchant l'homme et la femme. Si la France a réalisé un premier pas avec la généralisation du dépistage du cancer du col de l'utérus, les sociétés médicales signataires, regroupées dans un collectif scientifique, insistent aujourd'hui sur l'urgence :

- d'organiser un dépistage efficace (accès, utilisation des tests HPV),
- d'augmenter la couverture vaccinale des populations déjà ciblées en rétablissant activement la vérité scientifique et donc la confiance vis-à-vis de ces vaccins actifs et très bien tolérés,
- de lancer la vaccination universelle gratuite ou remboursée, sans distinction de sexe ou de risque, pour protéger filles et garçons, réduire les inégalités et participer, avec les autres pays, à l'élimination des cancers HPV induits, en suivant la recommandation de l'OMS.

Docum

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Schéma vaccinal GARDASIL9®

Vaccination de routine

- 11-14 ans filles et garçons **M0 M6**
- Dès l'âge de 9 ans si candidat(e) à une greffe d'organe solide : **M0 M2 M6**

Vaccination de rattrapage

- 15-19 ans filles et garçons : **M0 M2 M6**
- Jusqu'à 26 ans pour HSH : **M0 M2 M6**

Messages clairs et incitatifs

- La vaccination doit être évoquée au RDV vaccinal de 6 ans pour le RDV suivant
- Toute consultation chez les 11-19 ans doit être l'occasion de recommander le vaccin HPV
- **NON il n'y a pas besoin d'être vierge pour bénéficier du vaccin**
- **NON le fait de « faire attention », de ne pas avoir d'activité sexuelle ou de prendre une pilule ne protège pas des HPV**
- Pas d'immunité collective en France avec une CV à 24 % (4^e place en queue de peloton pour la CV en Région Europe) : **0 vaccin = zéro protection**
- **Le pronostic du cancer du col s'aggrave et 3 femmes meurent d'un CCU / jour.**
- **OUI il n'est jamais trop tard pour proposer le vaccin, même hors recos pour les femmes au-delà de 20 ans**

Estimation du nombre de cas évités par la vaccination de 80 % d'une cohorte* de 370 000 jeunes filles de 14 ans

Vacciner 142 jeunes filles évite ...

<https://www.youtube.com/watch?v=8BP9PIWV2Zk>

* Estimation réalisée d'après un modèle de Markov

Cohorte suivie à vie (85 ans) et bénéficiant d'une prévention par dépistage + vaccination - couverture vaccinale = 80 %

Paramètres vaccinaux : efficacité = 100% sur les HPV 6,11, 16, 18 - Durée de protection = vie entière. Bergeron C. et al. Abstract PS26-07, 24th IPV, Beijing 2007

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Nouveautés du calendrier 2021 : nouveautés réglementaires

• Rappels et rattrapages vaccinaux par les centres de vaccination anti-amarielle

Depuis le 1er juin 2020, les **vaccins remboursables** du calendrier des vaccinations administrés dans les CVI à l'occasion de la vaccination du voyageur par les PDS de ces centres, sont **pris en charge par l'assurance maladie** obligatoire, pour la part obligatoire

Application de l'article L. 174-21 du code de la sécurité sociale créé par l'article 58 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

• Vaccination contre la Covid19

Conditions d'organisation de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire sont fixées par les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiés prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

A noter que ces décrets ont notamment été modifiés par les décrets n° 2021-248 du 4 mars 2021, n° 2021-325 du 26 mars 2021 et n° 2021-384 du 2 avril 2021 pour préciser les professionnels de santé, étudiants en santé et autres professionnels pouvant intervenir pour prescrire, administrer et/ou injecter les vaccins anti-Covid et les modalités selon lesquelles ils peuvent réaliser ces actes dans le cadre de la campagne de vaccination.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Nouveautés du calendrier 2021 : nouvelles recommandations

- **IIM B^{1 2}** (en rouge = modifications selon RCP Juin 2018 RCP Mai 2020 ; en bleu = modification 2021)

Age	Recommandations vaccinales selon l'âge d'exposition
2 – 5 mois	Bexsero® M0 M2 (de préférence aux 3 ^e et 5 ^e mois de vie) et rappel entre 12 et 15 mois
6 – 11 mois	2 doses à 2 mois d'intervalle et rappel au cours de la 2 ^e année (au moins 2 mois après la primovaccination)
12 – 23 mois	2 doses à 2 mois d'intervalle et rappel 12 à 24 mois après
≥ 2 ans et adultes	2 doses à 1 mois d'intervalle et rappel chez les sujets présentant un risque continu d'exposition à infection méningococcique

1 Pas de vaccination systématique sauf recommandation particulière dont asplénie
2 Situations spécifiques notamment épidémique et d'hyperendémie

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'éditeur et présenté sous sa responsabilité.

RECOMMANDER
LES BONNES PRATIQUES

**RECOMMANDATION
VACCINALE**

Stratégie de vaccination pour la prévention des infections invasives à méningocoques : Le sérotype B et la place de BEXSERO®

Document n'ayant pas fait l'objet d'une relecture orthographique et typographique

Document de travail - 20 janvier 2021

Janvier 2021

La HAS demande aux sociétés savantes de se positionner sur la place du vaccin Bexsero
La HAS propose dans un rapport de 156 pages un statu quo sur la vaccination/ recos de 2013

Mars

Réponse attendue des sociétés savantes : **opposition unanime contre la HAS**

3 juin 2021

La HAS recommande dans un nouveau rapport de **130 pages la vaccination de tous les nourrissons**, qui représentent la classe d'âge la plus vulnérable à ces IIM B, en utilisant BEXSERO® selon le schéma de l'AMM.

43

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'éditeur et présenté sous sa responsabilité.

Répartition mondiale des méningocoques

- ❖ *Neisseria meningitidis*, principalement de sérogroupes A, B, C, W et Y.
- ❖ Cause importante de **morbidité et mortalité**.
- ❖ **Transmission interhumaine** par les sécrétions rhino-pharyngées lors de contacts proches. La transmission est favorisée dans le foyer familial ou les conditions de vie en collectivité
- ❖ Séquelles définitives dans **10 à 20 %** des cas :
 - **nécrose cutanée** (10 %) avec ou sans amputation
 - **déficit du neuro-développement** (7 %)
 - **surdité** (4 % des cas),
 - d'épilepsie, de troubles visuels...

- ❖ La **létalité était de 12 %** en France parmi les cas d'IIM survenus en 2017.
- ❖ **En France** : la vaccination contre la **méningite C est obligatoire chez les nourrissons** depuis le 1er janvier 2018 et recommandée chez les 2-24 ans non vaccinés. La vaccination contre les **méningites A, B, C, W, Y** est recommandée dans certains cas (populations à risque, aspléniques, voyageurs, au-contact d'un cas...).

<https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-et-septicemies-a-meningocoques> consulté le 09/09/2020

Zoom sur les infections invasives à méningocoque en France en 2019

Taux de notification des IIM selon le sérotype, France entière

Sérotype	Nbre de cas (%)	Nbre de décès
B	240 (53%)	16 (7 %)
C	54 (12 %)	7 (13 %)
Y	54 (12%)	7 (13 %)
W	93 (21 %)	25 (27 %)
X,E ou autre	8 (2%) dont 7 cas de X	
Total	459 dont 449 avec un sérotype	55 (12 %)

→ **Purpura fulminans** : 92 (20 %) 25% pour les IIM B, 13% pour les IIM C, 19% pour les IIM W et 7% pour les IIM Y (p=0,02).
→ Taux de séquelles précoces : **5% (24 cas)**

SPF
Les infections invasives à méningocoques en 2019
Centre national de référence des IIM, données 2019, avec l'aimable autorisation du Pr M.Taha, Institut Pasteur Paris

Nourrissons et jeunes enfants :
les plus à risque d'IIM

Incidence des IIM selon l'âge

Focus chez les 0-4 ans

	IIM (tous sérotypes)		IIM B		IIM C		IIM W		IIM Y	
	Nb de cas	Nb de décès	Nb de cas	Nb de décès	Nb de cas	Nb de décès	Nb de cas	Nb de décès	Nb de cas	Nb de décès
<1 an	65	6 (9%)	45	1 (2%)	1	-	13	4 (31%)	4	1
1-4 ans	62	4 (6%)	43	2 (5%)	2	-	12	2 (17%)	2	-
			88 cas de B		3 cas de C		25 cas de W		6 cas de Y	

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'atoueur et présenté sous sa responsabilité.

EVOLUTION DE LA POSITION DE LA HAS BEXSERO, une expérience mondiale

Approuvé dans 42 pays⁴

Intégré dans le calendrier vaccinal de 7 pays^{5,6,7,8}, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Andorre, Lituanie, Portugal²⁴ et République Tchèque²⁵

Recommandé pour les nourrissons par 17 organismes de santé, dont le JCVI (Royaume-Uni), l'ATAGI (Australie) et le SBIM (Brésil)⁷⁻²³

Plus de 52 millions de doses distribuées dans le monde⁴

Review
Recent advances in meningococcal B disease prevention: real-world evidence from 4CMenB vaccination

Federico Martín-Torres^{4,1}, Angelika Banzhoff^{8,2,4}, Chiara Azzari^{3,1}, Philippe De Wals^{4,4}, Robin Marlow^{2,5}, Helen Marshall¹⁵, Mariagrazia Pizza^{6,7}, Rino Rappuoli^{6,7}, Rafik Bekkat-Berkani^{1,8}

→ L'utilisation du vaccin BEXSERO dans le cadre d'une stratégie généralisée de prévention des IIM B en France n'est pas recommandée et pas remboursable, elle doit être effectuée en suivant les recommandations officielles.

4. Données internes GSK; 2020; 5. ECDC Vaccine Scheduler <https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu> - consulté en Janvier 2020. 6. Andorre; 7. Lituanie; 8. Australie; 9. Autriche; 10. Brésil; 11. République Tchèque; 12. Grèce; 13. Hongrie; 14. Pologne; 15. Royaume-Uni; 16. Chypre; 17. Espagne; 18. Belgique; 19. Portugal; 20. Israël; 21. Irlande; 22. Italie; 23. Canada; 24. Portugal; 25. République Tchèque.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

Données PHE d'impact : 4^{ème} année de réduction du nombre de cas d'IIM B en Angleterre³³

En 2018 :

- CV 2 doses à 12 mois : 92,5%
- CV 3 doses à 2 ans : 87,9%

Cas de MenB chez les enfants de moins de 5 ans

➤ **75% de réduction du nombre de cas d'IIM B dans les cohortes totalement éligibles à la vaccination**

➤ **Estimation de 277 cas d'IIM B évités sur les 3 années dans les cohortes éligibles à la vaccination,**

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

Portugal : étude nationale cas- témoins (PT- BEST)

PorTugal meningococcal B vaccine Effectiveness STudy

Parmi les cas d'IIM B dans l'étude PT-BEST, ceux ayant reçu ≥ 1 dose de BEXSERO ont guéris sans séquelles

Bexsero n'était pas dans le calendrier vaccinal portugais au moment de l'étude, mais était recommandé par des sociétés savantes de pédiatries³⁸

Couverture vaccinale globale à l'échelle nationale durant la période de l'étude **47%**

rsabilité.

Réponses du Conseil National Professionnel de la Pédiatrie au projet de recommandation vaccinale

CNP de Pédiatrie
Conseil National Professionnel de Pédiatrie

- **Schéma souhaité : 2+1 (3-5-13 mois)**
 - Car Vaccin efficace et sur.
 - Maladie rare mais incidence + élevée dans la petite enfance
 - Poids individuel et collectif lourd et sous-estimé
 - L'absence de recommandation accentue les inégalités sociales
- **Efficacité - tolérance démontrée par les études**
 - Protection croisée vis-à-vis des IIMW
 - Vies humaines et qualité de vie épargnées par la vaccination
- **Rareté de la maladie**
 - Cf. épidémiologie du méningo B : fréquence, incidence 20x/ grands enfants et 5x/1-4 ans
 - Morbi-mortalité non négligeable
- **Poids de la maladie et coût**
 - Cf. épidémiologie du méningo B : fréquence, incidence 20x/ grands enfants et 5x/1-4 ans
 - Morbi-mortalité

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

Schéma posologique pour les nourrissons à partir de 2 mois → schéma en 2+1¹

Age de la 1 ^{ère} dose	Primo vaccination	Intervalles entre les doses de primovaccination	Rappel
Nourrissons de 2 à 5 mois ^a	3 doses	≥ 1 mois	1 dose ^{b,c} entre 12 et 15 mois avec un intervalle ≥ 6 mois entre primovaccination et dose de rappel
	2 doses	≥ 2 mois	1 dose ^{b,c} entre 12 et 15 mois avec un intervalle ≥ 6 mois entre primovaccination et dose de rappel
Nourrissons de 6 à 11 mois	2 doses	≥ 2 mois	1 dose ^c Au cours de la 2 ^{ème} année avec un intervalle ≥ 2 mois entre primovaccination et dose de rappel
Enfants de 12 à 23 mois	2 doses	≥ 2 mois	1 dose ^c avec un intervalle de 12 et 23 mois entre primovaccination et dose de rappel
A partir de 2 ans*	2 doses	≥ 1 mois	Selon les recommandations officielles, une dose de rappel peut être envisagée chez les sujets présentant un risque continu d'exposition à infection méningococcique

Schéma posologique simplifié

Une dose = 0,5 ml de suspension. (a) La première dose ne doit pas être administrée avant l'âge de 2 mois. La sécurité et l'efficacité de Bexsero chez les nourrissons de moins de 8 semaines n'ont pas encore été établies. Aucune donnée n'est disponible. (b) En cas de retard, la dose de rappel ne doit pas être administrée au-delà de l'âge de 24 mois. (c) La nécessité et le moment d'administration d'une dose de rappel n'ont pas encore été déterminés.

*Il n'existe aucune donnée chez les adultes de plus de 50 ans.

L'utilisation du vaccin BEXSERO dans le cadre d'une stratégie généralisée de prévention des IIM B en France n'est pas recommandée et pas remboursable.

51

1. RCP BEXSERO.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Le calendrier vaccinal en population générale

	Vaccin contre :	18-24 ans	25 ans	35 ans	45 ans	65 ans	75, 85, 95 ans
Recommandations générales	Diphtérie (d), Tétanos (T), Poliomylélite (P)		Rappel dTcaP		Rappel	Rappel	Rappel
	Coqueluche acellulaire (ca)						
	Grippe					1 dose annuelle	
	Zona					Entre 65 et 74 ans : une dose	

- **dTP** : rendez-vous à **25 ans, 45 ans et 65 ans**, puis tous les 10 ans
- **Coqueluche** : cocooning à partir de 25 ans
- **Grippe** : une dose annuelle après 65 ans (cf. *MG, IDE, SF, pharmacien*)

Âge	Dose	Nombre de dose
6 mois – 8 ans	0,50 ml	1 ou 2*
≥ 9 ans et adulte	0,50 ml	1

- **Zona** : à **65 ans** une dose (rattrapage jusqu'à 74 ans)

Haut Conseil de la santé publique. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2021. Paris, Ministère des solidarités et de la Santé.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Grippe et pneumocoque en 2020-2021

- Pas (du tout) d'épidémie de grippe 2020-20/21¹ Moins 30 % d'infections invasives à

Attention, diminution transitoire : mesures « barrière » et frontières fermées.
Surtout ne pas arrêter de vacciner contre la grippe et le pneumocoque !

1. Grippe, France métropolitaine, SPF/réseau Sentinelles , 2. Angleterre Amin-Chowdury et al. CID 2021

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'utilisateur et présenté sous sa responsabilité.

Composition du vaccin 2021-2022 sur œuf Hémisphère nord

	Type de virus	Lieu d'origine	Numéro souche	Année isolement	Sous-type A Ha Na
	↓	↓	↓	↓	↓ ↓
1	A	Victoria	/ 2570	/ 2019	(H1N1)pdm09 (New)
2	A	Cambodia	/ e0826360	/ 2020	(H3N2) (New)
3	B	Washington	/ 02	/ 2019	Victoria (lignée B)
4	B	Phuket	/ 3073	/ 2013	Yamagata (lignée B)

- 1- nouvelle souche par rapport au vaccin 2020-2021
- 2- nouvelle souche par rapport au vaccin 2020-2021
- 3- inchangée par rapport au vaccin 2020-2021
- 4- inchangée par rapport au vaccin 2020-2021

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'utilisateur et présenté sous sa responsabilité.

Composition du vaccin 2021-2022 sur culture cellulaire Hémisphère nord

	Type de virus ↓	Lieu d'origine ↓	Numéro souche ↓	Année isolement ↓	Sous-type A Ha Na ↓ ↓
1	A / Wisconsin		/ 588	/ 2019	/ (H1N1)pdm09 (New)
2	A / Cambodia		/ e0826360	/ 2020	/ (H3N2) (New)
3	B / Washington		/ 02	/ 2019	/ Victoria (lignée B)
4	B / Phunket		/ 3073	/ 2013	/ Yamagata (lignée B)

1- nouvelle souche par rapport au vaccin 2020-2021

2- nouvelle souche par rapport au vaccin 2020-2021

3- inchangée par rapport au vaccin 2020-2021

4- inchangée par rapport au vaccin 2020-2021